



## ТАБЛЕТКИ И КАПКИ

Насладете се отново  
на млякото с Milkaid®



*Milkaid*® прави млякото и млечните продукти лесно смилаеми.

Съдържа ензима лактаза, който разгражда лактозата на прости и лесно усвоими захари - глюкоза и галактоза.

Лактазата е безопасен естествен ензим, намиращ се обичайно в храносмилателната системана човека.

*Milkaid*® капки и таблетки премахват чувството на дискомфорт, метеоризъм, колики и подпомагат организма при други симптоми, свързани с лактозната непоносимост.



*Milkaid*® подпомага предварително асимилирането на лактозата от млякото и млечните продукти, за да можете отново да се насладите на ползите от техния прием.

Да страдаш от лактозна непоносимост вече не означава да се откажеш от млякото, млечните продукти и от важните хранителни вещества, минерали и витамини, които те предоставят.

## КАПКИ И ТАБЛЕТКИ *Milkaid*<sup>®</sup>

**Капките *Milkaid*<sup>®</sup>** съдържат 4500 FCC NLU/g (при неутрално pH7) активни лактазни единици от дрожди *Kluyveromyces lactis*, разтворени във вода и глицерол, като стабилизатор. Действието им се изразява в разграждане на сложната млечна захар лактоза на две по-лесно смилаеми захари – глюкоза и галактоза. Така можете отново да се насладите на млякото и млечните продукти без притеснение.

**Просто добавете 3 капки *Milkaid*<sup>®</sup> към максимум 570 мл мляко, разклатете внимателно, оставете в хладилник за минимум 4 / максимум 24 часа;** за този период лактозата ще се разгради на прости лесноусвоими захари - глюкоза и галактоза и млякото ще е готово за консумация, готвене, добавяне към напитки, зърнена закуска и др., както топло, така и студено.

Млякото, обработено с лактаза, има същата хранителна стойност, но видът млечна захар (лактоза) е изменен и млякото има малко по-сладък вкус. Млякото, обработено с ензима лактаза, може да се използва по абсолютно същия начин като обикновеното мляко в напитки, за готвене, за приготвяне на йогурт, сладолед, или да се консумира директно. Без значение дали млякото е пълномаслено, обезмаслено или дълготрайно, то може да бъде ефективно и безопасно обработено без страх от поява на неприятни симптоми.

Три капки ще намалят лактозата със 70%, което е достатъчно за повечето хора. Предлагаме да започнете с 6 капки, което ще гарантира над 90% разграждане на лактозата, и да намалявате капките, докато откриете какво количество е най-добро за вас. Препоръчваме за малки деца да се започне с 10 капки за максимум 570 мл, което ще разгради лактозата 100%, и след това да намалявате с по една капка до постигане на оптималната доза.

Капките действат само и единствено в млякото! Добавят се в млякото! *Milkaid*<sup>®</sup> съдържат ензим лактаза, който се разрушава от високата температура, добавяйте към топло, а не горещо мляко. Не приемайте капките директно през устата. Не ги добавяйте във вода, сок или чай, капките действат в млякото. Пригответе млеката, предназначени за кърмачета винаги според инструкциите на производителя.

**Дъвчащите таблетки *Milkaid*<sup>®</sup>** съдържат ензима лактаза, имат вкус на малина. Всяка таблетка съдържа 3000 FCC ALU/g (при киселинно pH<7) активни лактазни единици и е без изкуствени овкусители, глутен, мая или лактоза. Ензимът лактаза подобрява разграждането на лактозата при хора с временна или не лактозна нетолерантност. Таблетките *Milkaid*<sup>®</sup> са разработени така, че разграждат лактозата, когато тя е в стомаха под влиянието на стомашните киселини. Те са удобни за приемане, ако се храните навън или приемате твърди храни, съдържащи лактоза. **Сдъвчете 1-2 таблетки веднага с приема на храни, съдържащи лактоза. Това количество обикновено е достатъчно да подпомогне асимилирането на лактозата.** Можете да увеличите количеството таблетки, колкото е необходимо за вашите нужди, но еднократната доза не трябва да надвишава **шест таблетки.**

Продуктите са хранителни добавки, да не се използват като заместител на разнообразното хранене. Да се съхранява при температура до 25°C на сухо и недостъпно за малки деца място. След отваряне капките се съхраняват в хладилник, за да се запази активността на ензима за период от 6 седмици. Да се пазят замръзване. След отваряне таблетките се съхраняват на стайна температура. Да не се употребява след изтичане срока на годност отбелязан на опаковката и ако предпазното фолио на флакона е нарушено.

Ензимът лактаза в *Milkaid*<sup>®</sup> е извлечен от естествени дрожди и е напълно безопасен.

**Производител:** Crosscare Ltd, Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland; **Вносител:** МАКАВЕ ЕООД, 1517 София, Сухата река, бл. 24, тел: 0878702023, [www.milkaid-bg.com](http://www.milkaid-bg.com)